

ПРАТ «Хімфармзавод «Червона Зірка»  
Україна, 61010, Харківська обл., м. Харків, вул.  
Горішніківська, буд. 1  
тел./факс (38057) 733-17-58  
e-mail: zvezda@id.ua, www.zvezda.kharkov.ua



Ф01-КП-СС-00-024

Ліцензія АЕ №637421 від 24.02.2015р.  
Свідоцтво про атестацію лабораторії ВКЯ  
№95 від 24.02.2012р.  
Свідоцтво про атестацію МБЛ №281 від 20.01.2016р.

### СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 3

**Вугілля активоване, таблетки по 0,25 г, по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці з картону. Маркування українською мовою.**

Діюча речовина: Вугілля активоване - 0,2500 г

Реєстр. посвідчення UA/9148/01/01 (Україна) від 01.10.2018  
Загальна кількість в серії 10000 уп.

№ серії 031124

Дата виробництва 11.2024

Аналіз виконаний згідно: МКЯЛЗ до РП №UA/9148/01/01, зм. нак. №638 від 09.09.14, зм. нак. №1495 від 29.11.17, зм. нак. №907 від 11.05.18, зм. нак. №1562 від 08.07.20

Дата видачі результату 10.12.2024

Термін придатності до 11.2029

| №  | Найменування показників                     | Вимоги МКЯЛЗ                                                                                                                                                                                                                                                                     | Результат аналізу                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Опис                                        | Таблетки чорного кольору круглої форми з плоскою поверхнею                                                                                                                                                                                                                       | Таблетки чорного кольору круглої форми з плоскою поверхнею                                                                                                                                                                             |
| 2  | Ідентифікація Вугілля                       | При нагріванні 0,5 г порошку розтертих таблеток в фарфоровому тиглі в полум'ї горілки до червоного кольору; порошок згоряє повільно без полум'я.                                                                                                                                 | Позитивна                                                                                                                                                                                                                              |
| 3  | Середня маса                                | 0,2750 ± 5% (від 0,2613 г до 0,2888 г)                                                                                                                                                                                                                                           | 0,2708 г                                                                                                                                                                                                                               |
| 4  | Однорідність маси                           | 20 одиниць таб. відбир. за стат. об'єкт. схемою, за кожну окремо і розрах. серед. масу. Лік. засіб витр. випроб., якщо не більше двох інд. мас відх. від серед. маси на величину, яка не перевищує 7,5%. При цьому жодна інд. маса не має відх. від серед. маси на величину ±15% | Відповідає                                                                                                                                                                                                                             |
| 5  | Адсорбційна активність за метиленовим синім | Не менше 50 мг, у перерахуванні на середню масу однієї таблетки                                                                                                                                                                                                                  | 66,3 мг                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | Втрата в масі при висушуванні               | Не більше 12 %                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,5 %                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7  | Об'єм адсорбційних пор                      | Об'єм адсорбційних пор по бензолу у розрахунок на середню масу однієї таблетки, має бути не менше 0,058 см³                                                                                                                                                                      | 0,118 см³                                                                                                                                                                                                                              |
| 8  | Стираність                                  | Не більше 1,0 %                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,1 %                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9  | Залишок після прожарювання                  | Не більше 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,1 %                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | Мікробіологічна чистота                     | Загальне число аеробних мікроорг. (ТАМС): 10000 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 10³ КУО/г. Тolerантні до жовчі грамнегативні бактерії: не більше 10³ КУО/г. Не допуск. Escherichia coli в 1 г; Salmonella в 10 г; St. aureus в 1 г                  | Загальне число аеробних мікроорг. (ТАМС): 500. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 20. Тolerантні до жовчі грамнегативні бактерії: менше 10. Escherichia coli в 1 г; Salmonella в 10 г; St. aureus в 1 г не виявлені |
| 11 | Зберігання                                  | Зберігати в оригінальній упаковці, окремо від речовин, що виділяють газу та пари, при температурі не вище 25 °C                                                                                                                                                                  | Відповідає                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 | Упаковка та маркування                      | У відповідності до МКЯЛЗ                                                                                                                                                                                                                                                         | Відповідає                                                                                                                                                                                                                             |

Висновок

Відповідає вимогам МКЯЛЗ

Начальник ВКЯ

*Бб*

Бантюкова С.В.

<10> 12 2024р.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції була вироблена (включаючи пакування/маркування) та проконтрольована у повній відповідності з вимогами GMP та специфікаціями, що містяться у реєстраційному довідку.

Дата видачі дозволу до реалізації <10> 12 2024р.



Вх.ан №1078  
19.12.24

ПРАТ «Хімфармзавод «Червона Зірка»  
Україна, 61010, Харківська обл., м.Харків, вул.  
Гордієнківська, буд. 1  
тел./факс (38057) 733-17-58  
e-mail: zvezda@itd.ua, www.zvezda.kharkov.ua



Ф01-КП-СС-00-024

Ліцензія АЕ №637421 від 24.02.2015р.  
Свідоцтво про атестацію лабораторії ВКЯ  
№95 від 24.02.2012р.  
Свідоцтво про атестацію МБЛ №281 від 20.01.2016р.

## СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 4

**Вугілля активоване, таблетки по 0,25 г, по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці з картону. Маркування українською мовою.**

Діюча речовина: Вугілля активоване - 0,2500 г

Реєстр. посвідчення UA/9148/01/01 (Україна) від 01.10.2018

Загальна кількість в серії 10005 уп.

МКАЛЗ до РП №UA/9148/01/01, зм. нак. №636 від 08.09.14, зм. нак. №1495 від 29.11.17, зм. нак. №907 від 11.05.18, зм. нак. №1562 від 08.07.20

№ серії 041124

Дата виробництва 11.2024

Дата видачі результату 12.12.2024

Термін придатності до 11.2029

| №  | Найменування показників                     | Вимоги МКЯЛЗ                                                                                                                                                                                                                                                                          | Результат аналізу                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Опис                                        | Таблетки чорного кольору круглої форми з плоскою поверхнею                                                                                                                                                                                                                            | Таблетки чорного кольору круглої форми з плоскою поверхнею                                                                                                                                                                                   |
| 2  | Ідентифікація Вуглець                       | При нагріванні 0,5 г порошку розтертих таблеток в фарфоровому тиглі в полум'ї горілки до червоного кольору; порошок згоряє повільно без полум'я.                                                                                                                                      | Позитивна                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Середня маса                                | 0,2750 ± 5% (від 0,2613 г до 0,2888 г)                                                                                                                                                                                                                                                | 0,2685 г                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4  | Однорідність маси                           | 20 одиниць таб. відбир. за стат. обґрунт. схемою, зваж. кожну окремо і розрах. серед. масу. Лік. засіб витр. випроб., якщо не більше двох інд. мас відх. від серед. маси на величину, яка не перевищує 7,5%. При цьому жодна інд. маса не має відх. від серед. маси на величину > 15% | Відповідає                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5  | Адсорбційна активність за метиленовим синім | Не менше 50 мг, у перерахуванні на середню масу однієї таблетки                                                                                                                                                                                                                       | 64,7 мг                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6  | Втрата в масі при висушуванні               | Не більше 12 %                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 %                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7  | Об'єм адсорбційних пор                      | Об'єм адсорбційних пор по бензолу у розрахунку на середню масу однієї таблетки, має бути не менше 0,058 см³                                                                                                                                                                           | 0,103 см³                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8  | Стираність                                  | Не більше 1,0 %                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,24 %                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9  | Залишок після прожарювання                  | Не більше 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,1 %                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 | Мікробіологічна чистота                     | Загальне число аеробних мікроорг. (ТАМС): 10000 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 10³ КУО/г. Тolerантні до жовч. грамнегативні бактерії: не більше 10³ КУО/г. Не допуск. Escherichia coli в 1 г; Salmonella в 10 г; St. aureus в 1 г                       | Загальне число аеробних мікроорг. (ТАМС): 800. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): менше 10. Тolerантні до жовч. грамнегативні бактерії: менше 10. Escherichia coli в 1 г; Salmonella в 10 г; St. aureus в 1 г не виявлені |
| 11 | Зберігання                                  | Зберігати в оригінальній упаковці, окремо від речовин, що виділяють газу та пари, при температурі не вище 25 °С                                                                                                                                                                       | Відповідає                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | Упаковка та маркування                      | У відповідності до МКЯЛЗ                                                                                                                                                                                                                                                              | Відповідає                                                                                                                                                                                                                                   |

Висновок

Відповідає вимогам МКЯЛЗ

Начальник ВКЯ

Б

Бантюкова С.В.

12.12.2024р.

Ця я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції була в об'єкті спеціального контролю (включаючи пакування/маркування) та проконтрольована у повній відповідності з вимогами ЄМР та спеціфікацій, що встановлені.

Дата видачі дозволу до реалізації <12> 12 2024р.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

уповноважена особа

О.Ю.Тіміна

ПРАТ «ХІМФАРМЗАВОД «ЧЕРВОНА ЗІРКА»  
Україна, 61010, Харківська обл., місто Харків,  
вулиця Гордієнківська, будинок 1  
тел./факс (38057) 733-17-58  
e-mail: zvezda@itf.ua, www.zvezda.kharkov.ua



Ф01-КП-СС-00-024

Ліцензія АЕ №637421 від 24.02.2015р.  
Свідоцтво про атестацію лабораторії ВКЯ  
№95 від 24.02.2012р.  
Свідоцтво про атестацію МБЛ №281 від 20.01.2016р.

### СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 1

**Вугілля активоване, таблетки по 0,25 г, по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці з картону. Маркування українською мовою**

Діюча речовина: Вугілля активоване - 0,2500 г

Реєстр. посвідчення UA/9148/01/01 (Україна) від 01.10.2018

Загальна кількість в серії 10000 уп.

№ серії 010425

Дата виробництва 04.2025

Аналіз виконаний згідно:

МКЯЛЗ до РП №UA/9148/01/01, зм. нак. №636 від

09.09.14, зм. нак. №1495 від 29.11.17, зм. нак. №907 від 11.05.18, зм. нак. №1562 від 08.07.20

Дата видачі результату 08.05.2025

Термін придатності до 04.2030

| №  | Найменування показників                     | Вимоги МКЯЛЗ                                                                                                                                                                                                                                                                         | Результат аналізу                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Опис                                        | Таблетки чорного кольору круглої форми з плоскою поверхнею                                                                                                                                                                                                                           | Таблетки чорного кольору круглої форми з плоскою поверхнею                                                                                                                                                                                  |
| 2  | Ідентифікація Вуглець                       | При нагріванні 0,5 г порошку розтертих таблеток в фарфоровому тиглі в полум'ї горілки до червоного кольору; порошок згоряє повільно без полум'я.                                                                                                                                     | Позитивна                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | Середня маса                                | 0,2750 ± 5% (від 0,2613 г до 0,2888 г)                                                                                                                                                                                                                                               | 0,2737 г                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | Однорідність маси                           | 20 одиниць таб. відбир. за стат. обґрунт. схемою, зваж. кожну окремо і розрах. серед. масу. Лік. засіб витр. випроб., якщо не більше двох інд. мас відх. від серед. маси на величину, яка не перевищує 7,5%. При цьому жодна інд. маса не має відх. від серед. маси на величину ±15% | Відповідає                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5  | Адсорбційна активність за метиленовим синім | Не менше 50 мг, у перерахуванні на середню масу однієї таблетки                                                                                                                                                                                                                      | 53,5 мг                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6  | Втрата в масі при висушуванні               | Не більше 12 %                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,1 %                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7  | Об'єм адсорбційних пор                      | Об'єм адсорбційних пор по бензолу у розрахунок на середню масу однієї таблетки, має бути не менше 0,058 см³                                                                                                                                                                          | 0,104 см³                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8  | Стираність                                  | Не більше 1,0 %                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,2 %                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9  | Залишок після прожарювання                  | Не більше 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,8 %                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 | Мікробіологічна чистота                     | Загальне число аеробних мікроорг. (ТАМС): 10000 КУО/г. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): 10² КУО/г. Толерантні до жовчі грамнегативні бактерії: не більше 10² КУО/г. Не допуск. Escherichia coli в 1 г; Salmonella в 10 г; St.aureus в 1 г                       | Загальне число аеробних мікроорг. (ТАМС): 800. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): менше 10. Толерантні до жовчі грамнегативні бактерії: менше 10. Escherichia coli в 1 г; Salmonella в 10 г; St.aureus в 1 г не виявлені |
| 11 | Зберігання                                  | Зберігати в оригінальній упаковці, окремо від речовин, що виділяють гази та пари, при температурі не вище 25 °С                                                                                                                                                                      | Відповідає                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | Упаковка та маркування                      | У відповідності до МКЯЛЗ                                                                                                                                                                                                                                                             | Відповідає                                                                                                                                                                                                                                  |

#### Висновок

Відповідає вимогам МКЯЛЗ

Начальник ВКЯ



*Б*

Бантюкова С.В.

<08> 05 2025р.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Ця серія продукції була вироблена (включаючи пакування/маркування) та проконтрольована у повній відповідності з вимогами GMP та специфікаціями, що містяться у реєстраційному додє.

Дата видачі дозволу до реалізації <08> 05 2025р.



Висновок № 0037 від 26.06.25