




ТОВ НВФ "МІКРОХІМ"

01013, Україна, м. Київ, Голосіївський район, вул. Будіндустрії, буд. 5, тел./факс (044) 284-60-12, (050) 216-93-92; e-mail: info@microkhim.com

Сертифікат № 2

Найменування продукції: ІН-АЛІТЕР		Номер серії: 20725	
лікарська форма: таблетки по 2 мг/0,625 мг		Розмір серії: 6381 уп.	
Номер реєстраційного посвідчення: UA/17135/01/01 термін дії необмежений		Дата виробництва: 07.2025 р.	
Сила дії/активність: 1 таблетка містить периндоприл терт-бутиламін 2,0 мг, що еквівалентно 1,669 периндоприлу та Індапаміду 0,625 мг		Дата закінчення терміну придатності: 07.2027	
Розмір та тип упаковки: По 10 таблеток у блістері, по 3 блістери разом з інструкцією для медичного застосування у пачці з картоном.			
СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО МКЯЛЗ			Результати випробувань
№ з/п	Найменування показника	Допустимі норми	
1	Опис	Круглі двоопуклі таблетки від білого до майже білого кольору	Методи контролю п.1 МКЯЛЗ та ДФУ загальні статті на лікарські форми. Таблетки
2	Ідентифікація Периндоприл терт-бутиламін Індапамід	Час утримування піку периндоприлу на хроматограмі випробуваного розчину має співпадати з часом утримування піку периндоприлу на хроматограмі розчину порівняння (а) На хроматограмі випробуваного розчину повинна виявлятися пляма, яка за коефіцієнтом утримування, величиною та інтенсивністю забарвлення відповідає плямі периндоприлу терт-бутиламіну на хроматограмі розчину порівняння (п)	п. 2.1 МКЯЛЗ та ДФУ 2.2.29 (метод ВЕРХ).
		Час утримування піку індапаміду на хроматограмі випробуваного розчину має співпадати з часом утримування піку індапаміду на хроматограмі розчину порівняння (а) На хроматограмі випробуваного розчину повинна виявлятися пляма, яка за коефіцієнтом утримування, величиною та інтенсивністю забарвлення відповідає плямі індапаміду на хроматограмі розчину порівняння (п)	п. 2.2 МКЯЛЗ та ДФУ 2.2.29 (метод ВЕРХ). п. 2.3 МКЯЛЗ та ДФУ 2.2.27 (метод ТШХ)
3	Середня маса таблетки та однорідність маси таблеток	Від 0,0950 г до 0,1050 г За однорідністю маси таблетки повинні відповідати вимогам ДФУ, 2.9.5	п. 3 МКЯЛЗ та ДФУ Загальні статті на лікарські форми. Таблетки. ДФУ 2.9.5
4	Супровідні домішки: - периндоприл терт-бутиламін - індапамід	Ідентифіковані домішки: Вп, не більше 0,3 % Гп, не більше 0,2 % Еп, не більше 0,4 % Нп, не більше 0,2 % Сп, не більше 0,1 % Дп, не більше 0,1 % В, не більше 0,3 % Кожна неідентифікована домішка, не більше 0,1 % Сума неідентифікованих домішок, не більше - Сума усіх домішок, не більше 1,5 % Не враховують домішки менше 0,05 %	п. 4 МКЯЛЗ та ДФУ 2.2.29
5	Розчинення - периндоприл терт-бутиламін - індапамід	Відповідність за трьома рівнями оцінювання з урахуванням Q = 75% S ₁ - не менше 80 % для кожної одиниці. S ₂ - середнє значення (S ₁ +S ₂) дорівнює або більше 75 %, і немає жодної одиниці менше 60 % S ₃ - середнє значення (S ₁ +S ₂ +S ₃) дорівнює або більше 75 % і не більше двох одиниць менше 60%, і немає жодної одиниці менше 50%	п. 5 МКЯЛЗ та ДФУ 2.9.3, 2.2.29
6	Однорідність вмісту діючої речовини в одиниці дозованого лікарського засобу - периндоприл терт-бутиламін - індапамід	I - для перших 10 одиниць: вміст у кожній дозованій одиниці знаходиться в межах від 85 % до 115 % від середнього вмісту. II - для 30 одиниць: якщо вміст не більш як в одній одиниці виходить за межі від 85 % до 115% і в жодній одиниці не виходить за межі від 75 % до 125 % від середнього вмісту.	п. 6 МКЯЛЗ та ДФУ 2.9.6 (тест А), 2.2.29
7	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - не більше 10 ³ КУО/г Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - не більше 10 ³ КУО/г Не допускається наявність Escherichia coli, в 1 г	п. 7 МКЯЛЗ та ДФУ 2.6.12, 2.6.13, 5.1.4
8	Кількісне визначення - периндоприлу терт-бутиламіну - індапаміду	від 1,90 мг/табл. до 2,10 мг/табл. від 0,594 мг/табл. до 0,656 мг/табл.	п. 8 МКЯЛЗ та ДФУ 2.2.29
9	Маркування	Відповідає до затвердженого тесту марування	п. 10 МКЯЛЗ

Коментарі: умови зберігання – при температурі не вище 30 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
 Виробнича дільниця: Україна, 04080 м. Київ-80. Вул. Кирилівська, 74, ПАТ «ФАРМАК». Ліцензія на виробництво АЕ № 637430 від 07.04.2015.
 Контроль якості: Україна, 04080, м. Київ -80, вул. Кирилівська, 74, ПАТ «ФАРМАК». Свідоцтво про атестацію № 390 від 22.01.2019.
 Сертифікація серії: Україна, м. Київ, Голосіївський район, вул. Будіндустрії, буд. 5, ТОВ НВФ «МІКРОХІМ». Ліцензія на виробництво лікарських засобів серії АВ № 538070 від 13.12.2013, Сертифікат GMP № 049/2024/GMP.
 Заява про сертифікацію: Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування та маркування) та проведено контроль її якості на вище вказаній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими місцевим регуляторним органом, а також у відповідності зі специфікаціями, що містяться в реєстраційному дощі. Протоколи виробництва, пакування та аналізу були переглянуті і встановлено відповідність GMP.
 Висновок: Відповідає вимогам МКЯЛЗ до РП № UA/17135/01/01 зі змінами на ІН-АЛІТЕР, таблетки по 2 мг/0,625 мг.
 Дозволено до реалізації
 Уповноважена особа з якості
 « 22 » 08, 2025 р.



Handwritten signature and date: 22.08.2025