Сертификат соответствия системы качества

Изготовитель: МОБСТЕЛЛ

Продукция: [illegible]

Код ТН ВЭД: [illegible]

Серийный выпуск: [illegible]

Схема сертификации: [illegible]

Сертификат № 20756

СЕРТИФИКАТ

на [illegible] (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982)

Срок действия с 01.12.2009 г. по 01.12.2012 г.

Выдан: [illegible]

Изготовитель: [illegible]

Адрес: [illegible]

Телефон: [illegible]

№	Наименование продукции	Код ТН ВЭД	Документы
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Сертификат соответствия системы качества

Изготовитель: МОБСТЕЛЛ

Продукция: [illegible]

Код ТН ВЭД: [illegible]

Серийный выпуск: [illegible]

Схема сертификации: [illegible]

Сертификат № 20756

СЕРТИФИКАТ

на [illegible] (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982)

Срок действия с 01.12.2009 г. по 01.12.2012 г.

Выдан: [illegible]

Изготовитель: [illegible]

Адрес: [illegible]

Телефон: [illegible]

№	Наименование продукции	Код ТН ВЭД	Документы
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Страница 1 из 2

МОЛОДЕЖЬ

Журнал выходит с 1936 года

Выпуск 12 (2012)

Содержание

Редакционная статья 3

Иванов А. Б. Молодежь и спорт 4

Петрова Е. С. Новые тренажеры 7

Сидоров К. Н. Итоги сезона 10

Кузнецова Т. Р. Фотоотчет 14

Редакция: 125993, г. Москва, ул. Поликарпова, 12, стр. 1

Тираж 5 000 экз. Подписано в печать 15.12.2012



Страница 1 из 2

МОЛОДЕЖЬ

Журнал выходит с 1936 года

Выпуск 12 (2012)

Содержание

Редакционная статья 3

Иванов А. Б. Молодежь и спорт 4

Петрова Е. С. Новые тренажеры 7

Сидоров К. Н. Итоги сезона 10

Кузнецова Т. Р. Фотоотчет 14

Редакция: 125993, г. Москва, ул. Поликарпова, 12, стр. 1

Тираж 5 000 экз. Подписано в печать 15.12.2012



МОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ





МОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ





Сертифікат серії інтегрального шрифту

Повна назва лікарського засобу	МОКСОНІДИН
Склад лікарського засобу	1 таблетка містить моксонідину – 0,2 мг
Лікарська форма	таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 0,2 мг
Упаковка	по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці з картону
Номер серії	03526
Країна-виробник	Україна
Країна призначення	Україна
Реквізити виробника, що відповідає за випуск серії, вказано в сертифікаті аналізу	

Сертифікат якості № 1049

МОКСОНІДИН,

таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 0,2 мг,
по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці з картону

Виготовлення регламентує № UA/21250/01/01, затверджений 17.01.15.21.2025 р.

Номер серії: 03526
Кількість продукції в серії: 2.200 т. 44.
Дата виробництва: 09.12.2025 р.
Дата закінчення терміну дії згідно МОЗ до реєстраційного посвідчення № UA/21250/01/01

№ п/п	Найменування показників	Вимоги методів контролю якості	Результати випробувань
1.	Опис	Таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею, вкриті плівковою оболонкою білого кольору	Таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею, вкриті плівковою оболонкою білого кольору
2.	Ідентифікація	1. ТШХ: на хроматограмі випробуваного розчину основній плямі відповідає основна пляма на хроматограмі розчину стандартного зразка моксонідину (~ 2 %) основна пляма на хроматограмі розчину порівняння (моксонідин) 2. ВЕРХ: на хроматограмі випробуваного розчину час утримування основного піку (~ 2 %) основного піку на хроматограмі розчину порівняння (моксонідин) 3. Кількісна реакція: розчин речовини, підкислений хлористоводневою кислотою, при додаванні розчину нітриту натрію утворює нітрозосполуку, що забарвлює розчин у червоний колір	Відповідає Відповідає Відповідає
3.	Середня маса	від 97 мг до 103 мг (±) мг ± 3,5 %	101 мг
4.	Розпадаємість	Не більше 30 % (Н), від початкового вмісту речовини, – 20 хв	3 хвилини
5.	Супровідні домішки	Допустимі межі вмісту: РК: домішка А – не більше 0,4 % домішка В – не більше 0,2 % домішка С – не більше 0,3 % домішка D – не більше 0,3 % неспецифіковані домішки, кожна – не більше 0,1 % сума домішок – не більше 1,5 %	Не виявлено 0,1 % Менше 0,1 % Менше 0,3 % Менше 0,1 % Менше 0,1 % Менше 1,5 %
		Протизначення домішок: РК: домішка А – не більше 0,4 % домішка В – не більше 0,2 % домішка С – не більше 0,3 % домішка D – не більше 0,3 % неспецифіковані домішки, кожна – не більше 0,1 % сума домішок – не більше 1,5 %	- - - - -
6.	Однорідність вмісту	Вміст моксонідину в одиниці дози (Х ДОЗ) – 2 Х Б	Відповідає

МОКСОНІДИН,

таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 0,2 мг,
по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці з картону

7.	Мікробіологічна чистота – загальна кількість аеробних мікроорганізмів (ЗАМАФ) – загальна кількість дріжджових та цвілевих грибів (ТУМС) – Escherichia coli	10³ КУО/г 10² КУО/г Не допускається в 1 г	3 КУО/г Менше 10 КУО/г Відсутні
8.	Хімічна чистота: вміст моксонідину	Не більше: від 0,190 мг/таб до 0,210 мг/таб Прийнятні межі: від 0,184 мг/таб до 0,210 мг/таб	0,101 мг/таб
9.	Однорідність	У межах вимог ДФУ	Відповідає
10.	Розчинність	За ДФУ: швидко розчинний у воді, важкорозчинний	Відповідає
11.	Термін придатності	2 роки	До 15.12.27
12.	Умови зберігання	Зберігати при кімнатній температурі не вище 25 °С	

Відповідає вимогам НД МОЗ України та реєстраційного посвідчення № UA/21250/01/01

Висновок: Згідно з вимогами НД

Керівник ВТК: Кочерга І.І.

Ціна реалізації, що не перевищує оптової ціни, зазначеної в цій інструкції, буде забезпечена в аптеках закладів охорони здоров'я України та комунальних аптечних закладах України.

Уповноважена особа: Кочерга В.А.

30.12.2025

ВІДДІЛ ЗБУТУ

Вх. № 1799
від 09.09.2026

Сертифікат серії лікарського засобу

Назва лікарського засобу:	МОКСОНІДИН
Склад/форма випуску:	1 таблетка вкрита плівковою оболонкою – 0,2 мг
Упаковка:	таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 0,2 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці з картоном
Виробник:	ТОВ "Фармацевтична фірма "Здоров'я"
Країна виробництва:	Україна
Країна-експортер:	Україна

Результат контролю якості лікарського засобу: згідно з сертифікатом

Сертифікат № 1051

МОКСОНІДИН,

таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 0,2 мг,
по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці з картоном

Експертне посвідчення № [illegible] від [illegible] р.

Номер серії: 725/16
Дата виробництва: 16.2016 р.
Серія МОКСОНІДИН не експортується в [illegible]

№ п/п	Найменування показника	Вимоги методу контролювання	Результат випробування
1.	Опис	Таблетки круглої форми двоопуклої форми, вкриті плівковою оболонкою білого кольору	Таблетки круглої форми, двоопуклої форми, вкриті плівковою оболонкою білого кольору
2.	Ідентифікація	1. ІЧ-спектр зразка субстанції, отриманий при зніманні таблетки, повинен відповідати спектру субстанції, зареєстрованому в тому ж діапазоні (± 2 см) основних смуг поглинання
		2. ТШХ: на хроматограмі випробуваного розчину, отриманій в системі розчинників (система 1), повинна бути одна основна плями, положення і забарвлення якої відповідає положенню і забарвленню основної плями на хроматограмі розчину порівняння (система 1)
3.	Середня маса	від 97 мг до 113 мг (РР № 1.7.1.)	104 мг
4.	Розпадаємість	не більше 6 хв (РР № 1.4.1.)	5 хвилин
5.	Супровідні домішки	Примесь А – не більше 0,5 % Примесь В – не більше 0,5 % Примесь С – не більше 0,5 % Примесь D – не більше 0,5 % Нерегламентовані домішки, кожна – не більше 0,5 % Сума домішок – не більше 2,5 %	Менше 0,5 % Менше 0,5 % Менше 0,5 % Менше 0,5 % Менше 0,5 % Менше 2,5 %
		Гранична кількість домішок: Примесь А – не більше 2,0 % Примесь В – не більше 0,5 % Примесь С – не більше 1,5 % Примесь D – не більше 1,5 % Нерегламентовані домішки, кожна – не більше 0,2 % Сума домішок – не більше 3,0 %	
6.	Однорідність вмісту	Вміст активної речовини в одиниці дозування повинен бути в межах 85,0 – 115,0 % від середнього вмісту	Відповідає

МОКСОНІДИН,
таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 0,2 мг,
по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці з картоном

7.	Мікробіологічна чистота (мікробіологічні показники згідно з ГФУ)	≤ 500 КУО/г ≤ 10² КУО/г Відсутність (не виявлено в 1 г)	не більше 500 КУО/г Менше ≤ 10² КУО/г Відсутні
8.	Кількісне визначення вмісту компонентів	Назва компонента: Моксонідин від 0,190 мг до 0,210 мг (95 %–105 %)	0,206 мг/табл.
		Гранична межа похибки: Від 0,180 мг до 0,220 мг (90 %–110 %)	-
9.	Упаковка	У картонній пачці 3 блістери	Вірно
10.	Маркування	Згідно затвердженого макету маркування	Відповідає
11.	Термін придатності	2 роки	До 10.18
12.	Умови зберігання	Зберігати при температурі навколишнього середовища не вище 25 °С	

Висновок: Серія МОКСОНІДИН, таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 0,2 мг, по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці з картоном, відповідає вимогам нормативної документації.

Уповноважена особа

ВІДДІЛ ЗБУТУ
ОДЕСА

Сертифікат серії лікарського засобу

Назва лікарського засобу:	МОКСОНІДИН
Склад/форма випуску:	1 таблетка вкрита плівковою оболонкою – 0,2 мг
Упаковка:	таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 0,2 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці з картоном
Виробник:	ТОВ "Фармацевтична фірма "Здоров'я"
Країна виробництва:	Україна
Країна-експортер:	Україна

Результат контролю якості лікарського засобу: згідно з сертифікатом

Сертифікат № 1051

МОКСОНІДИН,

таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 0,2 мг,
по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці з картоном

Експертне посвідчення № [illegible] від [illegible] р.

Номер серії: 725/16
Дата виробництва: 16.2016 р.
Серія МОКСОНІДИН не експортується в [illegible]

№ п/п	Найменування показника	Вимоги методу контролювання	Результат випробування
1.	Опис	Таблетки круглої форми двоопуклої форми, вкриті плівковою оболонкою білого кольору	Таблетки круглої форми, двоопуклої форми, вкриті плівковою оболонкою білого кольору
2.	Ідентифікація	1. ІЧ-спектр зразка субстанції, отриманий при зніманні таблетки, повинен відповідати спектру субстанції, зареєстрованому в тому ж діапазоні (± 2 см) основних смуг поглинання
		2. ТШХ: на хроматограмі випробуваного розчину, отриманій в системі розчинників (система 1), повинна бути одна основна плями, положення і забарвлення якої відповідає положенню і забарвленню основної плями на хроматограмі розчину порівняння (система 1)
3.	Середня маса	від 97 мг до 113 мг (РР № 1.7.1.)	104 мг
4.	Розпадаємість	не більше 6 хв (РР № 1.4.1.)	5 хвилин
5.	Супровідні домішки	Примесь А – не більше 0,5 % Примесь В – не більше 0,5 % Примесь С – не більше 0,5 % Примесь D – не більше 0,5 % Нерегламентовані домішки, кожна – не більше 0,5 % Сума домішок – не більше 2,5 %	Менше 0,5 % Менше 0,5 % Менше 0,5 % Менше 0,5 % Менше 0,5 % Менше 2,5 %
		Гранична кількість домішок: Примесь А – не більше 2,0 % Примесь В – не більше 0,5 % Примесь С – не більше 1,5 % Примесь D – не більше 1,5 % Нерегламентовані домішки, кожна – не більше 0,2 % Сума домішок – не більше 3,0 %	
6.	Однорідність вмісту	Вміст активної речовини в одиниці дозування повинен бути в межах 85,0 – 115,0 % від середнього вмісту	Відповідає

МОКСОНІДИН,
таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 0,2 мг,
по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці з картоном

7.	Мікробіологічна чистота (мікробіологічні показники згідно з ГФУ)	≤ 500 КУО/г ≤ 10² КУО/г Відсутність (не виявлено в 1 г)	не більше 500 КУО/г Менше ≤ 10² КУО/г Відсутні
8.	Кількісне визначення вмісту компонентів	Назва компонента: Моксонідин від 0,190 мг до 0,210 мг (95 %–105 %)	0,206 мг/табл.
		Гранична межа похибки: Від 0,180 мг до 0,220 мг (90 %–110 %)	-
9.	Упаковка	У картонній пачці 3 блістери	Вірно
10.	Маркування	Згідно затвердженого макету маркування	Відповідає
11.	Термін придатності	2 роки	До 10.18
12.	Умови зберігання	Зберігати при температурі навколишнього середовища не вище 25 °С	

Висновок: Серія МОКСОНІДИН, таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 0,2 мг, по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці з картоном, відповідає вимогам нормативної документації.

Уповноважена особа

ВІДДІЛ ЗБУТУ
ОДЕСА